

[ワクチン接種スケジュール]

() 様

ワクチン	初回	1週間	2週間	3週間	4週間	5週間	6週間	7週間	8週間	3ヶ月	様	12ヶ月	有効期間
接種日													
A型肝炎(国産)	○			○							○		15年以上
A型肝炎(輸入)	○			1回の接種で半年～1年有効							○		15年以上
B型肝炎ワクチン	○				○						○		15年以上(1カ月以降に抗体検査推奨)
破傷風	○	追加接種の場合 約10年有効				○					○		10年以上
	1度も接種歴がない場合は3回の接種を推奨(1968年からDPTとして定期接種化)												
狂犬病	○	○		(○)									5年
日本脳炎	○		(○)								(○)		5年
	渡航前に少なくとも1回か2回までの追加接種を推奨												
麻しん	○				(○)								2回接種で生涯免疫
髄膜炎菌	○												有効期間5年
麻しん・風しん混合	○				(○)								2回接種で生涯免疫
風しん	○				(○)								2回接種で生涯免疫
水痘	○				(○)								2回接種で生涯免疫
おたふくかぜ	○				(○)								2回接種で生涯免疫
	麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜワクチンは接種歴が1回あれば1回の追加接種で終了												
インフルエンザ	○												
ポリオ	○				(○)						(○)		10年以上
	基礎接種がない方:初回、2回目4週間後、3回目6～12か月後												
百日せき・ジフテリア・破傷風(国産)	○						○				○		10年以上
百日せき・ジフテリア・破傷風(輸入 TdaP)	○												
コレラ(輸入)	○		○										2年間
	6歳以上は初回と2週間後(1～6週間後) 経口接種												
腸チフス	○												3年間
ダニ脳炎(国産)	○				○						○		3年以上
	初回免疫の場合、1回0.5 mLを3回、筋肉内に接種する。2回目接種は、1回目接種の1～3か月後、3回目接種は、2回目接種の5～12か月後に接種												